

Philips Ingenia 1.5T

ПРОТОКОЛ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Дата проведения исследования: 14.07.2026

Ф.И.О. пациента: Силенко Е

Дата рождения: 19.07.1987

Возраст: 38

ИИН: 870719050660

Пол: Ж

Оценка затруднена из-за содержимого желудка и петель кишечника, в том числе из-за конституции тела пациента. МР признаки отека части подкожно-жировой клетчатки области исследования

Печень расположена в типичном месте, с чёткими ровными контурами, в размерах увеличена, обычной формы. МР-структура паренхимы печени без явных дополнительных очаговых патологических образований, МР сигнал минимально диффузно изменен в противофазу. Внутривенные желчные протоки имеют центрифугальный ход. Воротная вена трудно дифференцировать.

Жёлчный пузырь расположен в типичном месте, в размерах немного увеличен, с чёткими, ровными контурами, МР признаки загиба. Содержимое жёлчного пузыря застойная желчь с эффектом седиментации, на этом фоне единичный конкремент размером до 21 мм. Стенки жёлчного пузыря немного утолщены. Общий жёлчный проток трудно проследить.

Поджелудочная железа расположена в типичном месте, S-образной формы, с чёткими дольчатыми контурами. Размеры железы: (в пределах возрастной нормы). Структура паренхимы немного диффузно изменена. Вирсунгов проток не расширен. Парапанкреатическая жировая клетчатка не изменена.

Почки расположены в типичном месте, с чёткими ровными контурами, обычных размеров и формы. Структура паренхимы почек без явных дополнительных очаговых патологических образований. Ширина паренхимы правой почки - до 21 мм, левой - 21 мм, в поперечнике соответственно. Чашечно-лоханочная система почек немного расширена. Мочеточники в верхней их части без особенностей.

Надпочечники расположены в типичном месте, обычной формы, с чёткими контурами, в размерах не увеличены, толщина ножек надпочечников до 5,0 мм в поперечнике, без дополнительных очаговых патологических образований.

Селезёнка расположена в типичном месте, обычной формы, размером до 84x43x78 мм, с чёткими ровными контурами. Структура паренхимы без явных дополнительных очаговых патологических образований.

Поперечный размер **брюшной аорты** до 19 мм (норма 18,0-30,0 мм), **нижней полой вены** до 21 мм (норма до 25,0 мм). Забрюшинные **лимфоузлы** (органные и пристеночные) до 5,0 мм.

Заключение: МРТ данные за конкремент желчного пузыря. Косвенные МР признаки минимальных диффузных изменений печени; минимальных диффузных изменений поджелудочной железы; застойных явлений желчного пузыря.

Рекомендации: Консультация лечащего врача, хирурга. ЭГДС по показаниям

Важно! МРТ является методом опосредованной (непрямой) аппаратной (цифровой) интроскопии. Результат МРТ исследования, а также заключение специалиста, не могут рассматриваться в качестве окончательного диагноза, а должны оцениваться лечащим врачом только в совокупности с данными клинического анализа и других методов исследований

